



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR CLUJ

Str. Fagului .nr. 17,
Cluj-Napoca
Tel/fax 0264 274 636

Nr.464/O/21.05.2018

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 28

Tratament fitosanitar in plantatiile de MAR si PRUN impotriva daunatorilor : Viermele fructelor (*Cydia pomonella*) (*Laspeyresia funebrana*) Generatia I, Tratamentul 1, Paduchele lanos (*Eriosoma lanigerum*) Paduchele din San Jose , insecte minatoare, molia pielitei fructelor ,defoliatori,afide si alti daunatori specifici in pomicultura.

Efectuati tratamentul in perioada imediat urmatoare folosind un produs insecticid avizat pentru unul sau mai multi daunatori ce urmeaza sa fie combatuti .

Insecticide omologate pentru speciile de *Cydia p.* la mar si *Laspeyresia frnebrana* la prun :

Avaunt 150 SC – 0.033 % sau

Coragen – 0.01 % sau

Insegar 25 WG – 0.03 % sau

Decis 25 WG – 0.003 % sau

Karate Zeon – 0.015 % sau alte insecticide omologate cu efect similar.

Produse recomandate pentru tratament (insecticide)avizate pentru paduchele lanos / larvele paduchelui din San Jose :

Actara 25 WP (Tiametoxam 250 gr / kg) - 0.01 % sau

Calypso 480 SC (tiaclopid 480 g/ l)- 0.02 % sau

Dantop 50 WG (500 g / kg clotianidin)– 0.02 % (numai pentru mar)

Juvinal 10 EC (piriproxifen 100 gr / l) - 0.05 %sau

Movento 100 SC(100 g / l spirotetramat) – 0.2 % (mar si par) sau

Reldan 22 EC (225 g / l clorpirifos metil) – 0.2 % ;sau

Pyrinex Quick(250 g /l clorpirifos+6g/l deltametrin) – 0.1 % (numai specia mar) sau alte produse omologate cu efect similar.

Solutia trebuie sa ajunga in interiorul coroanei pe ramurile din partea superioara a pomilor dar si la insertia ramurilor unde sunt coloniile larvelor de lanos protejate de puful caracteristic.

Tratamentul urmatoare : dupa 7 – 10 zile . Folositi produsele prin alternanta .

Pentru boli (rapan , fainare , monilioza ,patarea alba la par , rugina parului , patarea rosie , ciuruii la prun) tratamentul se va complexa cu un fungicid specific :Luna Experience 400 SC -0.05 %; Score 250 EC – 0.015 %; Chorus 75 WG-0.02 %; Folicur Solo – 0.02 % ; Shavit F 72 WDG – 0.2 % (rapan –fainare); Captan 80 WDG – 0.2 % , Delan 700 WDG – 0.05 % ; Dithane M 45 – 0.2 %; Folpan 80 WDG – 0.15 % (rapan , monilinia, patarea rosie, ciuruire micotica) ,Cosavet 80 DF – 0.3 % ; Kumulus DF -0.3 % ; Thiovit Jet 80 WG – 0.3 % % (fainare) ;

La specia **PAR** pentru a combate puricele melifer al parului *Psylla spp.* (numai daca pragul de daunare este depasit : > 10 lastari atacati si prezenta pe frunze a excrementelor dulci , alegeti pentru tratament insecticidul care combate si acest daunator (Actara 0.015 % ; Mospilan 20 SG (Krimea) – 0.02 % ; Karis 10 CS – 75 ml / ha ; Poleci -0.075 % Vertimec 1.8 EC -0.1 – 0.15 % ; Movento 0. 2 %; Safran 1.8 EC – 0.1-0.15 % , Karate Zeon – 0.015 %

Recomandari de aplicare a tratamentului :

- Tratamentele se executa pe timp linistit . Se evita orele zilei cu temperaturi mai mari de 22° C .
- La prepararea solutiei se respecta concentratiile si dozele recomandate . Evitati subdozarea dar si supradozarea.
- Volumul de solutie la Ha : 1500 l pt specia mar si 1000 l / ha la par si prun.
- Folositi numai produse omologate in Romania si provenite din surse avizate.
- Cititi cu atentie instructiunile si informatiile inscise pe eticheta produselor de protectia plantelor.
- La realizarea amestecurilor consultati tabelele de compatibilitate a ppp.
- Puteti utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate.
- Reglati si mentineti in buna stare de functionare echipamentele de stropit pentru a asigura o pulverizare fina si uniforma Purtati echipament de protectie pe durata efectuarii tratamentului.

- Este interzis pasunatul in livezile tratate timp de 7 – 14 - 21 zile (functie de remanenta produsului folosit) .
- Anuntati apicultori din zona de efectuarea tratamentului .
- Utilizati produsele de protectia plantelor cu responsabilitate , in siguranta pentru sanatatea omului si a mediului inconjurator . Nu deversati restul de solutie in apele de suprafata , alte cursuri de apa .
- Clatiti ambalajele de trei ori dupa folosire . Ambalajele golite vor fi predate gratuit prin programul SCAPA al AIPROM.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp(persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare .
(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului(pe ultima pagina) se menționeaza câte pagini conține registrul,purtînd semnătura(și ștampila ,după caz) fermierului sau administratorului societății Utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au obligația să păstreze ,pentru o perioadă de cel puțin 3 ani,evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin(1) din Regulamentul(CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței atrage după sine sancțiuni cu amenzi de la 8.000 lei la 10.000 lei.

Nu tratați langa cursurile de apa (SMR 10) si santuri .

Nu deversatii solutiile ramase pe camp sau in apropierea apelor de suprafata (GAEC 3).

Latimea fasiilor de protectie de pe terenurile agricole din vecinatatea apelor de suprafata « : Obligativu de 1 m pe terenurile cu panta , pana la 12 % si 3 m pentru cele cu Panta mai > de 12 % . Se vor respecta normele de securitatea **muncii,protectia albinelor,animalelor si mediului**

inconjurator,asa cum prevede legislatia in vigoare precum si protocoalele de colaborare nr.328482/2015 si 3242/F/2016 .

Primariile trebuie sa afiseze buletinul de avertizare la loc accesibil pentru cetateni.

Intocmit:

Coordonator OFJ Cluj ,

Ing. Elena Suci