



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR CLUJ

*1- in Crăciun
Apiden public la 10/10*

JUDEȚUL CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI TURENI
Nr. intrare 4918
leșire din 02.07.2018

*P. V. a Pădej + Pado
3.07.2018*

Nr. 644 / O / 02.07.2018

Cluj-Napoca, Jud. Cluj,
Str. Fagulului .nr. 17
Tel/fax 0264/ 274 636

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 54

Fitosanitar Cluj emite avertizare pentru combaterea organismului de daunare: *Ambrosia artemisiifolia/Ambrosia elatior*, în parloage, terenuri necultivate, terenuri în paragina din loc. Cluj-Napoca și alte localități unde aceasta buruiana este prezentă în jud. Cluj.

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat creșterea, dezvoltarea și răspândirea organismului de daunare *Ambrosia artemisiifolia/Ambrosia elatior*.

Există peste 30 de specii de AMBROZIE

Ambrosia (*Ambrosia*) este un gen de plante erbacee, sau de arbuști, aparținând familiei Asteraceae, provenind din America de Nord și America de Sud, de unde s-a răspândit prin Europa.

Este una dintre principalele cauze de „febră a fânului”, cauzate de polenul .

În scopul distrugerii ambrosiei și prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv până cel târziu la data de 30 iunie-05 iulie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau ale lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a ambrosiei.

Cei care nu-și îndeplinesc această obligație vor primi un avertisment scris și, dacă nu se conformează, vor fi amendați cu amenzi cuprinse între 750 și 5.000 de lei - persoanele fizice, și 5.000- 20.000 de lei pentru persoanele juridice. O comisie mixtă va verifica și va constata nerespectarea acestor dispoziții leg:



S. M. Floria Crivei
A. Popescu
[Signature]



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR CLUJ

Str. Fagului .nr. 17
Cluj-Napoca, Jud. Cluj,
Tel/Fax 0264 274 636

Nr. 645/O/02.07.2018

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.55

Tratament fitosanitar la culturile de cartof , impotriva agentilor de daunare : **Gândacul din Colorado (*Leptinotarsa decemlineata*) Gen. 2 T₂, afide (*Macrosiphon euphorbiae*)+ mana cartofului (*Phytophthora infestans*) T₄, alternarioza (*Alternaria solani*) etc.**

Unde se constata prezenta larvelor sau adultilor Gandacului din Colorado, (3-4 larve /mp; 1 adult / la 4-5 tufe), afide , tratamentul se complexeaza cu un insecticid avizat :

Insecticide recomandate :

- Mavrik 2 F – 0,2 l/ha sau
- Mospilan 20 SG – 0,1 kg/ha sau
- Lasser 240 SC – 0,1 l/ha sau
- Calypso 480 SC (0.02 %) – 0.08 l / ha sau
- Coragen – 0.0625 l / ha sau alte produse pt.protectie a plantelor omologate cu efect similar.

Realizati un amestec cu unul din fungicidele:


Pt. Mana cartofului (*Phytophthora infestans*) T₄, alternarioza (*Alternaria solani*) etc :

Fungicide recomandate :

- Melody compact - 2 kg/ha sau
- Infinito 687,5 SC - 1,4 l/ha sau
- Equation pro - 0,4 kg/ha sau
- Armetil Cobre (0.25 %) – 2.5 kg / ha sau
- Curzate Manox (0.25 %)- 2.5 kg / ha sau alte produse de protectie a plantelor omologate cu efect similar.

Alte recomandari la efectuarea tratamentelor fitosanitare :

- Efectuati tratamentele pe timp racoros, dimineata si seara
- Frunzisul sa fie uscat , viteza vantului sa nu depaseasca 4-5 m / s ;
- Nu folositi **acelasi produs (sistemic)** pentru mai mult de 2-3 tratamente pe sezon .
- Alternati produsele sistemice (din clase chimice diferite)
- Alegeți pentru tratamentele DUPA in florit produse care contin **si Cu** ca partener de amestec sau **Cu simplu sau Fluazinam** ca s.a. pentru a preveni migrarea manei la tuberculi .
- Daca folositi numai produse de contact (preventive) efectuati un Tratament dupa fiecare ploaie
- Pentru daunatori tratamentul urmat dupa 8 - 10 zile, daca acestia sunt prezenti .
- Duzele aparatelor de stropit sa fie reglate corespunzator pentru a asigura o pulverizare cat mai uniforma .
- La realizarea amestecurilor efectuati un test de compatibilitate .



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR CLUJ

Str. Fagului .nr. 17
Cluj-Napoca, Jud.Cluj,
Tel/Fax 0264 274 636

Nr.646/O/02.07.2018

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.56

Legume câmp- tomate, ardei, vinete, gullii , varză).

Mana (Phytophthora spp.), alternarioza (Alternaria spp.), pătarea cafenie (Cladosporium fulvum), fusarioză (Fusarium spp.), verticilioză (Verticilium spp.), alte boli micotice și bacteriene, boli ale coletului + dăunători (molia minieră afide, molii, pureci, acarieni, tripsi).

Perioadele ploioase urmate de temperaturi mari si umiditate atmosferica mare sunt favorabile atacului.

Efectuați tratamentul in perioada imediat urmatoare(cand timpul este favorabil)folosind unul din produsele de protectie a plantelor:

Daca exista simptome de mana in cultura se foloseste obligatoriu un produs sistemic :

- Aliette 80 WDG – 0.3 % sau
- Previcur Energy – 0.15 % sau
- Manoxin M -0.25 %

Sau

- Acrobat MZ 69 – 2.0 kg / ha sau
- Ridomil Gold MZ 68 WG – 0.25 % sau
- Melody Compact 49 WG – 0.2 % sau
- Verita - 0.25 % sau
- Equation Pro – 0.4 kg/ ha sau
- Folio Gold – 0.2 % ; sau
- Pergado MZ(GETT) - 0,2 – 0,25% sau
- Copac – 0,3% sau alte produse pentru protectia plantelor cu efect similar omologate.

Pentru daunatori unul din insecticidele:

- Actara 25 WG – 0,06kg/ha sau
- L:ider 200 SL - 0,3 l/ha sau
- Mospilan 0,2 – 0,4 ok /ha(functie de daunatorul/cultura de combatut) sau
- Insecticid-acaricid : Vertimec 1.8 EC – 0.1 % sau alte insecticide omologate,cu efect similar.

Nu se vor trata culturile de legume pentru consum curent decat dupa recoltarea in prealabil a legumelor .

Se va respecta cu strictete timpul de pauza inscris pe eticheta pentru fiecare produs de peotectie a plantelor utilizat.

La culturile cu frunze lucioase ceapa, varza se adauga obligatoriu in solutia de stropit adjuvant specific Silwet (0.05 %) sau Nu – Film)

La prepararea solutiei se vor respecta concentratiile si dozele recomandate . In cazul amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor , fizica si chimica.